

Farmacodivulgación

ALGUNOS DE LOS EFECTOS ADVERSOS MÁS COMUNES EN LOS NIÑOS Y MEDICAMENTOS MÁS PROBABLES QUE LOS CAUSAN

| EFECTO ADVERSO | FÁRMACO O GRUPOS DE FÁRMACOS |
|-----------------------------|--|
| Acné | Corticosteroides |
| Agresión | Anfetaminas, esteroides anabólicos, anticonvulsivos |
| Alucinaciones | Efedrina y pseudoefedrina, antihistamínicos, metilfenidato |
| Asma broncoespasmos | Aspirina, AINE, propanolol |
| Ataxia | Benzodiacepinas, carbamazepina, fenitoína, y otros anticonvulsivos |
| Bloqueo cardíaco | Digoxina |
| Candidiasis | Antibacteriano de amplio espectro, esteroides inhalados |
| Constipación | Hierro, analgésicos opiáceos |
| Cushingoidismo | Corticosteroides |
| Depresión respiratoria | Opiáceos, sedantes e hipnóticos |
| Diarrea | Antibacterianos de amplio espectro, hierro, laxantes |
| Disfunción renal | Aminoglucósidos, frusemida |
| Exantema | Casi todos los medicamentos |
| Gingivitis | Medicamentos con sucrosa |
| Hiperglucemia | Corticosteroides; frusemida y tiacidas, adrenalina |
| Hipertrofia de las encías | Fenitoína |
| Hipopotasemia | Agonista B ₂ , corticosteroides, diuréticos |
| Hirsutismo | Corticosteroides, minoxidil, fenitoína |
| Insuficiencia hepática | Aspirina (síndrome de Reye), valproato sódico |
| Irritabilidad | Teofilina y otros broncodilatadores |
| Kemícterus | Sulfonamidas |
| Linfadenopatía | Anticonvulsivos |
| Lupus erimatoso sistémico | Anticonvulsivos, hidralacina, isoniazida |
| Malestar gástrico | Hierro, AINE |
| Náuseas | Todos los medicamentos por vía oral |
| Nistagmo | Anticonvulsivos |
| Psicosis | Corticosteroides, metilfenidato |
| Reacciones extrapiramidales | Haloperidol, metoclopramida, fenotiacinas |

| | |
|---------------------------------|--|
| Síndrome de Reye | Aspirina |
| Síndrome gris del recién nacido | Cloranfenicol |
| Somnolencia | Anticonvulsivos, antihistamínicos |
| Sordera | Aminoglucósidos, ácido etacrínico, frusemida |
| Supresión del crecimiento | Corticosteroides, metilfenidato |
| Temblores | Antihistamínicos, anfetaminas, metilfenidato |
| Tinnitus | Aminoglucósidos, aspirina |
| Vómitos | Casi todos los medicamentos por vía oral |

Nota: Los ensayos farmacológicos con niños presentan dificultades de índole ética que a menudo impiden que los fabricantes obtengan una licencia (permiso de venta) para usar un medicamento específicamente en niños. Los pediatras tienen que usar productos formulados para adultos apartándose de las instrucciones de la ética. Dicho uso no debe impedir que los médicos (y los farmacéuticos) notifiquen reacciones adversas presuntas. Estos informes son más importantes aun cuando se dispone de poca información adicional.

Tomado de: Medicamentos y Terapéuticas 1998; 17(1):36-9