

Medicamentos nuevos del grupo empresarial Labiofam: Nutrisol jarabe y Propolina tintura

New drugs produced by Labiofam company: Nutrisol syrup and Propolin tincture

NUTRISOL JARABE

Presentación: frasco de polietileno tereftalato (PET) color ámbar por 500 mL.

Fabricante: Empresa Productora y Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos de Matanzas. GENIX®, LABIOFAM. Cuba.

Composición: mezcla de componentes de savia de pseudotallo de plátano (*Musa paradisiaca*), propóleos y miel de abeja. Jarabe.

Características organolépticas: líquido color pardo a carmelita rojizo y sabor dulce-amargo.

Vía de administración: oral.

Indicaciones: suplemento nutricional. Uso profiláctico o adyuvante en personas con desórdenes del tracto gastrointestinal, así como del sistema inmune asociados a procesos infecciosos o crónicos.

Contraindicaciones: no utilizar en pacientes alérgicos a productos apícolas.

Instrucciones para su uso: agítese antes de usarse.

Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.

Forma de consumo:

Niños: una cucharadita (5 mL) antes de la ingesta de alimentos, 3 veces al día.
Adultos: una cucharada (15 mL) antes de la ingesta de alimentos, 3 veces al día.

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez: conservado de 2 a 8 °C tiene un periodo de validez de 1 año. A temperatura ambiente (30 ± 2 °C) tiene un periodo de validez de 6 meses. Protéjase de la luz.

PROPOLINA TINTURA

Presentación: frasco ámbar de 120 mL.

Fabricante: Empresa Productora y Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos de Matanzas. GENIX®, LABIOFAM. Cuba.

Composición: mezcla de propóleos en solución hidroalcohólica que contiene 60 mg de sustancias bioactivas por mililitro de tintura.

Características organolépticas: líquido ligeramente viscoso, untoso al tacto, de color pardo oscuro, sabor amargo y color característico.

Vía de administración: tópica y oral.

Forma de consumo:

Vía oral. Niños: disolver 15 gotas en un vaso de agua. Ingerir 3 veces al día alejado del horario de ingesta de alimentos. Adultos: disolver 30 gotas en un vaso de agua. Ingerir 3 veces al día alejado del horario de ingesta de alimentos.

Vía tópica: aplicar la tintura directamente sobre la lesión cutánea entre 2 y 3 veces al día. Para su uso como colutorio, disolver 30 gotas y enjuagar la boca o hacer gárgaras no menos de 3 veces al día.

Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento: consérvase a temperatura ambiente, no mayor de 30 °C.